

# Afschotperiode vrouwelijk reewild

## Wat is er tegen de maand maart?

Een jaar geleden werd in dit blad aandacht besteed aan de huidige (provinciaal deels verschillende) afschotperioden voor vrouwelijk reewild en de eventuele wenselijkheid om die te veranderen (De Nederlandse Jager nr. 1/2012). In dit artikel geven Guus Rutten en Hubert van Loo hun visie op dit onderwerp.

In zijn artikel over andere afschotperioden voor vrouwelijk reewild stelt Jan Smit het volgende voor:

- Afschot reekalveren, ongeacht het geslacht, in de periode van 1 oktober t/m 31 januari;
- Afschot smalreeën en geiten van 1 december t/m 31 januari.

Hier kunnen ons inziens vraagtekens bij worden gezet. Uiterekend december en januari zijn wat betreft afschotresultaten de minst productieve maanden in de meeste (in ieder geval onze Limburgse) WBE's. Het reewild zet in deze wintermaanden alles op een laag pitje en komt alleen op de lopers als het strikt noodzakelijk is.

### Verstoring


Door teveel verstoring in deze periode krijgt het reewild later de rekening gepresenteerd. Een geit schieten in deze tijd is fnuikend voor de jonge kalveren, die vervolgens het grootste deel van de winter alleen moeten overleven met alle gevolgen van dien (daarom geldt als stelregel: eerst de kalveren schieten alvorens de bijbehorende geit, red.).

### Smalreeën

In Europa komen alleen de Schotse afschotperioden grotendeels overeen met de Nederlandse. In Duitsland kan men de hele zomer smalreeën schieten: dat gaat in een moeite door als men toch al op de bok aanzit. Hieraan is echter altijd het risico

Afschotperioden voor reewild		
FBE	Bok	Geit
Utrecht	1 april t/m 31 augustus	1 december t/m 31 maart
Gelderland	1 mei t/m 15 september	1 december t/m 15 maart
Veluwe	1 mei t/m 15 oktober	1 oktober t/m 15 maart
Noord-Nederland	15 april t/m 15 september	1 januari t/m 15 maart
Zeeland	hele jaar	1 september t/m 31 maart
Overijssel - Flevoland	1 april t/m 15 september	1 december t/m 31 maart
Limburg	hele jaar	1 oktober t/m 31 maart
Brabant	1 mei t/m 15 september	1 januari t/m 15 maart

In het concept van de wet Natuurbescherming worden de provincies genoemd als de instanties die de afschottijden voor wildsoorten vaststellen. De vrees lijkt gerechtvaardigd dat dit opnieuw leidt tot een grote variatie in de regelgeving. Het zou veel beter zijn indien voor geheel Nederland een eensluidende afschotperiode wordt vastgesteld. Men zou dan kunnen overwegen om de periode voor het geiten- en kalverenafschot vast te leggen van 1 oktober t/m 31 maart.



In de winter spaart het reewild energie en zet de stofwisseling een paar knopjes lager (foto: Erik de Jonge)

verbonden van foutief aanspreken, bijvoorbeeld de verwisseling met een jonge geit die nog niet heeft gezet of die de pasgeboren kalveren ergens heeft afgelegd. In de praktijk blijkt dat de laatste helft van februari en de maand maart de meest effectieve periode is voor de regulatie van geiten en kalveren. Maart heeft als voordeel dat geiten en kalveren goed kunnen worden aangesproken en dat de geit de tijd heeft gehad haar kalveren door de winter te loodsen.

### Embryo's

De grote embryo's die de geiten in deze periode hebben, schrikken veel jagers af. Een sentimenteel argument dat niets met beheer te maken heeft. Want het is natuurlijk zo dat geiten gedurende de gehele periode na de bronsttijd in het bezit zijn van embryo's. Alleen zijn ze tot rond de jaarwisseling, als de groei start, nog nauwelijks te vinden.

Tekst: Guus Rutten (WBE Land van Horne en WBE Roerstreek) en Hubert van Loo (WBE Grensland)




Foto: Michael Migos

Uit de grafieken blijkt duidelijk dat in enkele Limburgse WBE's maart de meeste effectieve maand is voor zover de afschotperiode loopt tot 1 april. Ook in Utrecht levert de maand maart volgens de FBE het beste afschotresultaat op.

## De laatste helft van februari en de maand maart is de meest effectieve periode voor de regulatie van reegeiten en -kalveren

### Effectieve afschotperioden

In het najaar kunnen de smalreeën en kalveren worden bejaagd en eventueel de geiten met hun kalveren, indien er sprake is van ziekten, ongevallen of andere ongewenste situaties. Het is dan mogelijk het afschotplan te volbrengen in het voorjaar: de volwassen geiten hebben dan de gelegenheid gehad om hun kalveren voor te bereiden op een zelfstandig leven. En het afschot kan veel effectiever worden uitgevoerd, aangezien de activiteit van het reewild vanaf half februari duidelijk toeneemt. Wat de bokken betreft: men kan natuurlijk het gehele jaar bokken reguleren, maar om in de wintermaanden volwassen bokken te schieten, die niet of net hebben afgeworpen of een beginnend gewei in de bast vertonen, is niet erg aantrekkelijk voor de meeste reewildjagers. Houd de periode dus maar op 15 april tot 1 oktober. Het resterende afschot kan worden gerealiseerd door bokkalveren te schieten in de wintermaanden. ■

Foto: Rob Bulder

